

AVERTISSEMENTS AGRICOLES [®]

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

(73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Grandes Cultures

Le 17 décembre 1984

N°37

COLZA

LARVES D'ALTISE
LARVES DE CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

SITUATION

. ALTISE

Les parcelles n'ayant pas reçu de protection à l'automne contre les adultes présentent des infestations faibles à moyennes.

- * En Limousin : 4 à 25 % de plantes attaquées
- * En Auvergne : 15 à 20 % de plantes attaquées (localement 60 à 70 %)

. CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

Ce ravageur est présent dans l'ALLIER et le PUY-DE-DOME. Les différents sondages effectués nous permettent de constater une extension de ce ravageur vers le Sud du PUY-DE-DOME (secteurs de GIGNAT, LAPS). Les infestations sont de l'ordre de 30 à 40 % de plantes touchées.

PRECONISATIONS

Une visite de vos parcelles s'impose actuellement et plus particulièrement celles qui n'ont pas reçu de protection contre les adultes.

LARVE ALTISE



extrémités noires,
présence de pattes.

LARVE CHARANCON



tête brunâtre, pas de
pattes.

Examiner 25 plantes minimum par parcelle au niveau des pétioles des feuilles âgées. Il est recommandé de fendre au couteau les pétioles pour observer les larves.

P. 1. 10

Intervenir dès que :

- ou
- (- 2 pieds sur 3 portent une larve d'altise
 - (
 - (- 10 à 20 % de pieds sont occupés par une larve de charançon du
 - (bourgeon terminal

En cas de présence des 2 insectes, tenir compte de l'infestation charançon pour décider de l'intervention.

Utiliser :

- ou
- (- oléoparathion éthyl : . 300 g m.a./ha pour l'altise
 - (. 350 g m.a./ha pour le charançon
 - (
 - (- oléoparathion méthyl : . 350 g m.a./ha pour l'altise
 - (. 400 g m.a./ha pour le charançon

NE PAS MELANGER VOTRE INSECTICIDE AVEC UN HERBICIDE
ET RESPECTER UN DELAI DE 3 SEMAINES ENTRE L'APPLICATION DES 2 PRODUITS.

TRAITER LORSQUE LA TEMPERATURE EST SUPERIEURE À 5°C.